

conheça a doença de Chagas

Formas de transmissão



Mãe infectada para filho.



Contato direto com fezes de barbeiro após a picada.



Acidente laboratorial.



Transfusão de sangue ou transplante de órgãos.



Consumo de alimento contaminado.

FASE AGUDA

Fase inicial da doença

- Febre persistente (mais de 7 dias);
- Dor de cabeça;
- Fraqueza intensa;
- Inchaço no rosto e pernas;
- Manchas vermelhas na pele.

No caso de picada do barbeiro, pode aparecer uma lesão semelhante a um furúnculo no local.

FASE CRÔNICA

Pacientes não tratados na fase aguda podem desenvolver a fase crônica da doença, e apresentar complicações **cardíacas** ou **digestivas**.

É recomendado realizar o exame em pessoas que:

- Tenham algum familiar com diagnóstico confirmado.
- Moram (ou moraram) em área rural com relato de presença de barbeiro.
- Realizaram transfusão de sangue antes do ano de 1992.

Como se prevenir

Evite o contato com o barbeiro. Dentro de casa, ele se esconde em frestas nas paredes. Mantenha os ambientes limpos e sem entulhos, inclusive os anexos, como galinheiros e estábulos.

Só consuma alimentos bem higienizados - lavados e desinfetados.

Comunique o seu agente de saúde caso encontre o inseto e siga as orientações necessárias.



Gestantes devem fazer o exame para a doença de Chagas no pré-natal.

Converse com a equipe de saúde caso você se encaixe em uma dessas situações!

A doença de Chagas tem tratamento!